



SUIVI DE LA MORSURE DE TIQUE

À compléter et remettre aux parents à la fin du camp en cas de morsure de tique.

Nom de l'enfant :

Date de la morsure :

Localisation de la morsure sur le corps :

Date et heure du retrait de la tique : __ / __ / __ à __ h __

Méthode de retrait : Pince à tique Autre (non conseillé)

Évolution de la morsure :

- Après 24h : Rien à signaler Rougeur Gonflement
 Autre :
- Après 48h : Rien à signaler Rougeur Gonflement
 Autre :

Apparition de symptômes ? Oui Non

Si oui, précisez en entourant :

Rougeur persistante Maux de tête Douleurs musculaires et articulaires
Fièvre Gonflement des ganglions lymphatiques Fatigue inhabituelle

Nom de l'animateur-riche référent-e :

Contact :



RETIRER UNE TIQUE : MODE D'EMPLOI

Avec une pincette

1



Saisissez la tique par la tête avec une fine pincette.



Évitez de la prendre par l'abdomen.



N'utilisez pas une pince trop large.

2



Retirez la tique de votre peau par la tête.

3



Retirez-la verticalement, sans tourner.

Avec une pince à tiques




1



Refermez-la sur la tique, le plus près possible de la peau.

2



Et tirez vers le haut.